

# ノロウイルス感染症を予防しよう!!

## <床などに飛び散った患者の嘔吐物の処理方法>

ノロウイルス感染症患者の便や嘔吐（おうと）物中には大量のノロウイルスが存在します。適切に処理しましょう。

### 処理をする前に

1. 周囲にいる人を離れた場所へ移動させ、窓を開けるなど換気を行います
2. 嘔吐物の飛散を防ぐため、新聞紙やペーパータオルなどで覆います
3. 嘔吐した人に対する対応を行います
4. 嘔吐物の処理を行います  
[1、3はできれば同時進行で、嘔吐物の処理は最小人数で行います。  
嘔吐物は素手で触らない(手袋を使用)]

日ごろより用意しておくもの



### 塩素系消毒液(1,000ppm)を約3リッター作成する方法

作りたい濃度	考え方				作成		
	原液の濃度		希釈倍率		原液		水
0.1% (=1,000ppm)	1%	の場合	10倍	にする	330	mlを	水 3L に入れる
	6%		60倍		50		
	12%		120倍		25		

- ・嘔吐物の処理は1,000ppmでお願いします。
- ・塩素系消毒薬は漂白作用があります。
- ・必ず手袋をして肌などに直接触れないようにお願いします。



1. マスク、使い捨てのガウンまたはエプロン、手袋をする



2. バケツに消毒液を作り、その中に新聞紙やタオルなどを浸す



3. まず、新聞紙で嘔吐物を取り除き、次にタオルで拭く



4. ふき取った新聞紙やタオルはビニール袋へ入れる



5. すべて入れ終わったビニール袋の口をしっかりと縛る



6. 嘔吐物入りのビニール袋を、別のビニール袋へ入れる



7. 同じ袋に使用した手袋なども一緒に入れ、しっかりと縛る

8. 嘔吐物をふき取った場所は、消毒薬で湿らせたタオルなどでしばらく(10~30分)覆っておく  
塩素系消毒薬は、金属を腐食させるので良く拭き取り10分くらいしたら水で拭く

9. しっかりと手を洗い、うがいをする